

レジメンcode:	C85-26
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	R-GDP
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*]	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8
	デキサート	33	mg/body	点滴(15分)	d1~4
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
d-クロルフェニラミン		1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	500ml	1 本	
主管②		2時間	
4) プロイメンド	150mg	1 V	
生食	100ml	1 本	
▶側管①	点滴	30分	主管②開始60分後から
5) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	5 V	
生食	50ml	1 本	
▶側管②	点滴	15 分	側管①に続いて

次ページあり

6) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>
生食	100ml	1 本
	主管③	点滴 30 分
7) シスプラチン(フリプラチン)		75 mg/m <sup>2</sup>
生食	500ml	1 本
	主管④	点滴 2時間
8) マンニトール	300ml	1 V
	主管⑤	点滴 1時間
9) 硫酸Mg補正液	20ml	1 A
ソララクト	1L	1 袋
	主管⑥	点滴 3時間
10 ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約13時間〉

day2、3

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 硫酸Mg補正液	20ml	1 A
ラクテック	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

day4

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分

〈所要時間 15分〉

次ページあり

day8

---

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
<hr/>		
2) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>
生食	100ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
<hr/>		
3) 生食	50ml	1 本
<hr/>		

フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉