

レジメンcode:	C85-16
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	Bendamustine単剤
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	トレアキシン	120	mg/m ²	点滴	d1、2

day1

1) グラニセトロン	3mg	1	A		
デキサート	3.3mg	1	A		
デキサート	6.6mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分	【ケモセーフ使用】	
2) トレアキシン		120	mg/m ²		
大塚蒸留水	100ml	1	本	1Vあたり40mLの蒸留水	
生食	250ml	1	袋	で溶解。全量250mL	
	主管②	点滴	1時間		
3) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
4) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約2時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15分 【ケモセーフ使用】
2) トレアキシシ		120 mg/m ²	
大塚蒸留水	100ml	1 本	1Vあたり40mLの蒸留水
生食	250ml	1 袋	で溶解。全量250mL
	主管②	点滴	1時間
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉