

レジメンcode:	C85-32
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	DeVIC療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	300	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
VP-16	エトポシド	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
IFM	イホマイド	1500	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
DEX	デキサート	33	mg/body	点滴(15分)	d1~3

day1

1) プロイメンド	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	主管①	点滴	30分	
2) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	15 分	
3) カルボプラチン(パラプラチン)		300 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	
4) エトポシド		100 mg/m ²		
生食	500ml	1 袋		
	主管④	点滴	2時間	
5) メイロン	20ml	1 A		
生食	500ml	1 袋		
	主管⑤	点滴	2時間	
6) 生食	50ml	1 本		【ケモセーフ使用】
	▶側管①			ルート確保
7) イホマイド		1500 mg/m ²		
生食	250ml	1 本		
	▶側管②	点滴	2時間	主管⑤と同時に

次ページあり

8) ウロミテキサン	300 mg/m ²
------------	-----------------------

▶側管 静注 1日3回

IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後

9) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管⑥~⑨ 点滴	それぞれ2時間で
10) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約14時間〉

day2、3

1) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管① 点滴	15 分
2) エトポシド		100 mg/m ²
生食	500ml	1 袋
	主管② 点滴	2時間
3) メイロン	20ml	1 A
生食	500ml	1 袋
	主管③ 点滴	2時間
4) 生食	50ml	1 本
	▶側管①	【ケモセーフ使用】 ルート確保
5) イホマイド		1500 mg/m ²
生食	250ml	1 本
	▶側管② 点滴	2時間 主管③と同時に
6) ウロミテキサン		300 mg/m ²
	▶側管 静注	1日3回
		IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後
7) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管④~⑦ 点滴	それぞれ2時間で
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

次ページあり

day4

1) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
-------------------	-------	-----

	主管①	点滴	2時間
2) メイロン	20ml		1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml		1 本
	主管③	点滴	2時間
4) メイロン	20ml		1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml		1 本
	主管④	点滴	2時間

〈所要時間 約8時間30分〉

*G-CSFの予防的投与が望ましい。

*70歳以上の高齢者では、投与量を25～30%減量(DEXは減量しない)が望ましい。

*IFM

①ポリカーボネート製三方活栓不可

②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内