

レジメンcode:	C85-33
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	GCD
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8
	デキサート	[*1]	mg/body	点滴(15分) or 内服	d1~4
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1

day1

1) アロキシ	0.75mg	1	V	
デキサート	6.6mg	5	V	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15	分
2) ゲムシタビン		1000	mg/m <sup>2</sup>	
生食		1	本	
	主管②	点滴	30	分
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5	AUC	
生食	250ml	1	本	
	主管③	点滴	1	時間
4) 生食	50ml	1	本	
				フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒	
				ルートロック

〈所要時間 約2時間〉

次ページあり

【\*1】【内服の場合】

day2~4

1) デカドロン		40 mg/日
	内服	朝食後

【\*1】【注射の場合】

day2、3

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ
3) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック
		〈所要時間 約30分〉

day4

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ
		〈所要時間 約30分〉

day8

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>
生食	100ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
3) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ
		〈所要時間 約1時間〉