

レジメンcode:	C85-34
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	VR-CAP療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BOR	ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注射	d1、4、8、11
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1、4、8、11

- 1) ベルケイド 1.3 mg/m²
 生食 1.2ml
 皮下注

day1

- 1) 生食 50ml 1本 内服前投薬、心電図確認
 ルート確保、【ケモセーフ使用】
- 2) リツキシマブ(リツキサン) 375 mg/m²
 生食 500ml 生食で10倍に希釈
 主管① 点滴 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr
 と1時間ごとに投与速度を上げる
 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
- 3) グラニセトロン 3mg 1A
 生食 50ml 1本
 主管② 点滴 15分
- 4) エンドキサン 750 mg/m²
 生食 250ml 1袋
 主管③ 点滴 1時間
- 5) ドキシソルビシン(アドリアシン) 50 mg/m²
 生食 50ml 1本
 主管④ 点滴 全開
- 6) 生食 50ml 1本
 フラッシュ

〈所要時間 約8時間〉

次ページあり

day1

1) カロナール	200mg	2 錠
d-クロルフェニラミン		1 錠
	内服	リツキシマブ投与30分前

day1~5

1) プレドニゾン		100 mg/body
	内服	朝昼食後

連日

1) バクタ		1 錠/day
アシクロビル	400mg	0.5 錠/day
	内服	朝食後

ニューモシチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている。