

レジメンcode:	C85-15
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-CHOP(1日法)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d1
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

1) カロナール	200mg	2錠	
d-クロルフェニラミン		1錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1~5

1) プレドニゾロン		100 mg/body	
	内服		朝昼食後

day1

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保、【ケモセーフ使用】
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) グラニセトロン	3mg	1A	
生食	50ml	1本	
主管②	点滴	15分	
4) エンドキサン		750 mg/m ²	
生食	250ml	1袋	
主管③	点滴	1時間	
5) ドキシソルビシン(アドリアシン)		50 mg/m ²	
生食	50ml	1本	
主管④	点滴	全開	

次ページあり

6) オンコピン 1.4 mg/m² 最大2mg[*2]

生食 50ml 1本
主管⑤ 点滴 全開

7) 生食 50ml 1本

フラッシュ

〈所要時間 約8時間〉
