

レジメンcode:	C15-05
適応がん種:	食道癌
レジメン名:	アクプラ+5-FU+RT
間隔:	5週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
NDP	アクプラ	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~5
RT		2	Gy	計 60Gy	

**day1【ケモセーフ使用】**

1) パロノセトロン	0.75mg	1	V	
デキサート	6.6mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15分	

2) アクプラ		80	mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
生食	500ml	1	袋	
	主管②	点滴	1時間	

3) フルオロウラシル(5-FU)		800	mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
生食	1000ml	1	本	
	主管③	点滴	24時間	

〈所要時間 ー〉

**day2~5【ケモセーフ使用】**

1) デキサート	6.6mg	1	V	
生食	50ml	1	本	
	▶側管①	点滴	15分	

2) フルオロウラシル(5-FU)		800	mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
生食	1000ml	1	本	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

**day6**

1) 生食	50ml	1	本	
				ルートフラッシュ

〈所要時間 ー〉