

レジメンcode:	C16-17
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	Ramucirumab
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
RAM	サイラムザ	8	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1

1) 生食	20ml	1	A		
					ポート確認
2) ポラミン	5mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分		
3) サイラムザ		8 mg/kg		インラインフィルター必須	
生食	250ml	全量250mLになるように生食調製			
	主管②	点滴	初回60分		
			2回目以降30分[*1]		
4) 生食	50ml	1	本		
	主管③	点滴	15分		
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
					ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉

〈初回 約2時間〉

*蛋白尿があらわれることがあるので、本剤投与中は蛋白尿を定期的に検査すること(減量基準あり)

*infusion reactionがあらわれることあり

・grade3、4 → 本剤の投与を直ちに中止し、再投与しないこと

・grade1、2 → 投与速度を50%減速し、その後の全ての投与においても減速した投与速度で投与すること

*インラインフィルター使用必須

*調製後:室温4時間、冷所24時間以内までに使用を開始すること