

レジメンcode:	C85-40
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-miniCHOP(1日法)
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
VCR	オンコビン	1	mg/body	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	40	mg/m <sup>2</sup>	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

day1

1) カロナール	200mg	2錠	
d-クロルフェニラミン		1錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1~5

1) プレドニゾロン		40 mg/m <sup>2</sup>	
	内服		朝昼食後

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) グラニセトロン	3mg	1A	
生食	50ml	1本	
主管②	点滴	15分	
4) エンドキサン		400 mg/m <sup>2</sup>	
生食	250ml	1袋	
主管③	点滴	1時間	【ケモセーフ使用】
5) ドキシソルビシン(アドリアシン)		25 mg/m <sup>2</sup>	
生食	50ml	1本	
主管④	点滴	全開	【ケモセーフ使用】
6) オンコビン		1 mg/body	
生食	50ml	1本	
主管⑤	点滴	全開	【ケモセーフ使用】
7) 生食	50ml	1本	

フラッシュ

〈所要時間 約8時間〉