

レジメンcode:	C03-16
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	Pembrolizumab(3週間)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴(30分)	d1

day1

1) 生食	20ml	1	A		
				ポート確認	
2) 生食	50ml	1	本		
				ルート確保	
3) キイトルーダ		200	mg/body		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	30分	インラインフィルター必須	
4) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ用	
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約1時間〉

【キイトルーダ】

- *インラインフィルター(0.2~5 μ m)を使用する。
- *調製時、又は希釈後に振盪により微粒子が生成される可能性があるため、バイアルは振盪せず、激しく攪拌しない。
- *希釈後の最終濃度1~10mg/mlとする。
- *生食又は5%ブドウ糖に溶解する。同一点滴ラインを使用して他の薬剤を併用同時投与しない。
- *希釈後、25℃以下で6時間以内または2~8℃で合計24時間以内に使用する。
- *有害事象(肺、肝、内分泌障害、皮膚、胃腸、腎、神経関連など)対処アルゴリズム(国内臨床試験における)を参照する。
- *臨床試験での検査スケジュール、投与延期または休薬基準を参照する。

次ページあり

<国際共同第Ⅲ相試験 KEYNOTE-048試験>

観察項目	治療開始前	治療サイクル（1サイクル21日間）						治療終了
		1	2	3	4	5	6	中止時来院
バイタルサイン	○	○	○	○	○	○	○	
12誘導心電図	○							
ECOG Performance Status	○	○	○	○	○	○	○	○
妊娠検査(尿中又は血清β-hCG)	○							
凝固系検査(PT/INR及びaPTT)	○							
血液学的検査/血液生化学的検査	○		○	○	○	○	○	○
尿検査	○		○		○		○	
甲状腺検査(T ₃ 又はFT ₃ 、FT ₄ 及びTSH)	○		○		○		○	
画像評価①	○				○		○	○

バイタルサイン：体温、脈拍、呼吸数、体重、血圧、身長(スクリーニング時のみ計測)

血液学的検査：ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画、赤血球数、好中球絶対数、リンパ球絶対数

血液生化学的検査：総蛋白、アルブミン、ALT、AST、ALP、HCO₃⁻、総ビリルビン、直接ビリルビン(総ビリルビンが基準値上限を超えた場合)、BUN/尿素、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、Mg、P、血糖値

尿検査：潜血、糖、蛋白、比重、顕微鏡検査(異常値の場合)

①：9週以降6週毎、12ヵ月経過後は9週毎

*上記項目以外にも、ACTH、血中コルチゾールの検査も定期的に行うこと。