

レジメンcode:	C34-01	備考
適応がん種:	小細胞肺癌	
レジメン名:	CDDP+CPT-11	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トホ <sup>®</sup> テンシ)	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(90分)	d1、8、15
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A	イリノテカンの投与1時間～1時間30分前に アプレピタント(イメド <sup>®</sup> )125mg内服
生食	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	2時間	
2) 生食	500ml		1 袋	
	主管②	点滴	2時間	
3) パロノセトロン	0.75mg		1 V	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
ブスコパン	20mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管③	点滴	15 分	
4) イリノテカン(トホ <sup>®</sup> テンシ)			60 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml		1 袋	
	主管④	点滴	90分	
5) ラクテック	500ml		1 袋	
	主管⑤	点滴	90 分	
6) シスプラチン(フリプラチン)			60 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	主管⑥	点滴	2時間	
7) マンニトールS	300ml		1 袋	
	主管⑦	点滴	1時間	
8) ソルラクト	1L		1 袋	
	主管⑧	点滴	3時間	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒	

ルートロック

〈所要時間 約14時間〉

次ページあり

day2、3

---

アプレピタント(イムト <sup>®</sup> )		80 mg
	内服	朝食後

---

day2、3

---

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 硫酸Mg補正液		1 A
ソルラクト	1L	1 袋
	主管②	点滴 4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

---

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day8、15【ケモセーフ使用】

---

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
ブスコパン	20mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) イリノテカン(トポテン <sup>®</sup> )		60 mg/m <sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋
	主管②	点滴 90分
3) 生食	50ml	1 本

---

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉