

レジメンcode:	C3-01
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	FP
間隔:	3~4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	60~80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	600~800	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~4

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|
| 1) 硫酸Mg補正液 | | | 1 A | |
| 生食 | 500ml | | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 | |
| 2) 生食 | 500ml | | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | |
| 3) ホスアプレピタント | 150mg | | 1 V | |
| 生食 | 100ml | | 1 本 | |
| | ▶側管① | 点滴 | 30分 | 主管②開始60分後から |
| 4) パロノセトロン | 0.75mg | | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | | 1 A | |
| 生食 | 50ml | | 1 本 | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 | 側管①に続いて |
| 5) シスプラチン(フリプラチン) | | 60~80 | mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | | | 総液量650ml以下になるように生食を調製 |
| | 主管③ | 点滴 | 2時間 | |
| 6) フルオロウラシル(5-FU) | | 600~800 | mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 1000ml | | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 24時間 | |
| 7) マンニトールS | 300ml | | 1 袋 | |
| | ▶側管③ | 点滴 | 1時間 | 主管④と同時に |
| 8) ソルラクト | 1L | | 1 袋 | |
| | ▶側管④ | 点滴 | 4時間 | 側管③に続いて |

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分

2) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	1000ml	1 袋	
	▶側管②	点滴	4時間

3) フルオロウラシル(5-FU)		600~800 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day4【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分

2) フルオロウラシル(5-FU)		600~800 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day5

1) 生食	50ml	1 本	
-------	------	-----	--

フラッシュ

〈所要時間 ー〉