

| | |
|-----------|-------------|
| レジメンcode: | C16-01 |
| 適応がん種: | 胃癌 |
| レジメン名: | TS-1 + CDDP |
| 間隔: | 5週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|------|----------------|-----|-------------------|----------|--------|
| TS-1 | ティーエスワン | [*] | mg | 内服(朝夕食後) | d1~d21 |
| CDDP | シスプラチン(プリプラチン) | 60 | mg/m ² | 点滴(2時間) | d8 |

[*]: 下表を参考

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day8【ケモセーフ使用】

| | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | ポート確認 | | |
| 2) 硫酸Mg補正液 | | 1 A | | | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | | | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 | | |
| 3) 生食 | 500ml | 1 袋 | | | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | | |
| 4) ホスアプレピタント | 150mg | 1 V | | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 30分 | 主管②開始60分後から | |
| 5) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 | 側管①に続いて | |
| 6) シスプラチン(プリプラチン) | | 60 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | | |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | | | |
| | 主管③ | 点滴 | 2時間 | | |
| 7) マンニトールS | 300ml | 1 袋 | | | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 | | |
| 8) ソルラクト | 1L | 1 袋 | | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 3時間 | | |

次ページあり

| | | |
|---------------|-------|---------|
| 9) ラクテック | 500ml | 1 袋 |
| | 主管⑥ | 点滴 90 分 |
| 10) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 |

ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

day9、10

| | | |
|--------------|-------|---------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A |
| | | ポート確認 |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V |
| 生食 | 50ml | 1 本 |
| | 主管① | 点滴 15 分 |
| 3) 硫酸Mg補正液 | | 1 A |
| ソララクト | 1L | 1 袋 |
| | 主管② | 点滴 4時間 |
| 4) ラクテック | 500ml | 1 袋 |
| | 主管③ | 点滴 2時間 |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 |

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day1～21

| | |
|------------|---------|
| 1) ティーエスワン | [*] mg |
| | 内服 朝夕食後 |

[*]

| 体表面積 | 投与量 |
|-------------|------------------|
| 1. 25㎡未満 | 40mg/回 【80mg/日】 |
| 1.25～1.5㎡未満 | 50mg/回 【100mg/日】 |
| 1.5㎡以上 | 60mg/回 【120mg/日】 |