

レジメンcode:	C34-02
適応がん種:	小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+VP-16+RT
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
RT		3	Gy	計 45Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|------|---|
| 1) 硫酸Mg補正液 | | 1 A | | エトポシドの投与1時間~1時間30分前に
アプレピタント(イメド [®])125mg内服 |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 | |
| 2) 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | |
| 3) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 15 分 | |
| 4) エトポシド | | 100 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 | |
| 5) ラクテック | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 90分 | |
| 6) シスプラチン(ブリプラチン) | | 80 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 2時間 | |
| 7) マンニトールS | 300ml | 1 袋 | | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 1時間 | |
| 8) ソルラクト | 1L | 1 袋 | | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 3時間 | |
| 9) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | |

ルートロック

〈所要時間 約14時間30分〉

次ページあり

day2、3

アプレピタント(イマト)		80 mg
	内服	朝食後

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分

2) エトポシド		100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間

3) 硫酸Mg補正液		1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管③	点滴	4時間

4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
--------------	------	-----	--

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉