

レジメンcode:	C15-02
適応がん種:	食道癌
レジメン名:	FP
間隔:	術前3週間 術後4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~d5

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	ポート確認		
2) 硫酸Mg補正液		1 A			
生食	500ml	1 袋			
	主管①	点滴	2時間		
3) 生食	500ml	1 袋			
	主管②	点滴	2時間		
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	▶側管①	点滴	30 分	主管②開始60分後から	
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
デキサート	6.6mg	1 V			
生食	50ml	1 本			
	▶側管②	点滴	15 分	側管①に続いて	
6) シスプラチン(ブリプラチン)		80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製			
	主管③	点滴	2時間		
7) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
生食	1000ml	1 袋			
	主管④	点滴	24時間		
8) マンニトールS	300ml	1 袋			
	▶側管③	点滴	1時間	主管④と同時に	
9) ソラクト	1L	1 袋			
	▶側管④	点滴	4時間	側管③に続いて	

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V			
生食	50ml	1 本			
	▶側管①	点滴	15 分	午前中に	
2) 硫酸Mg補正液		1 A			
生食	1000ml	1 袋			
	▶側管②	点滴	4時間		
3) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋			
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて	
					〈所要時間 ー〉

day4、5【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V			
生食	50ml	1 本			
	▶側管①	点滴	15 分	午前中に	
2) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋			
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて	
					〈所要時間 ー〉

day6

1) 生食	50ml	1 本			
					フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
					ルートロック
					〈所要時間 ー〉