

| | | |
|-----------|-------|----|
| レジメンcode: | C3-02 | 備考 |
| 適応がん種: | 頭頸部癌 | |
| レジメン名: | FP+RT | |
| 間隔: | 4週間 | |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|------|----------------|-----|-------------------|----------|------|
| CDDP | シスプラチン(フリプラチン) | 20 | mg/m ² | 点滴(2時間) | d1~4 |
| 5-FU | フルオロウラシル(5-FU) | 400 | mg/m ² | 点滴(24時間) | d1~5 |
| RT | | | | | |

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|------|-----------|
| 1) 硫酸Mg補正液 | | 1 A | | |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 | | |
| | 主管① | 点滴 | 4時間 | |
| <hr/> | | | | |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 15 分 | |
| <hr/> | | | | |
| 3) シスプラチン(フリプラチン) | | 20 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 2時間 | |
| <hr/> | | | | |
| 4) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 24時間 | |
| <hr/> | | | | |
| 5) ソルラクト | 1L | 1 袋 | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 4時間 | 主管④と同時に |

〈所要時間 - 〉

次ページあり

day2~4【ケモセーフ使用】

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------|
| 1) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 24時間 前日の主管に続いて |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | ▶側管① | 点滴 | 15 分 主管①と同時に |
| 3) シスプラチン(フリプラチン) | | 20 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 総液量700ml以下になるように生食を調製 | |
| | ▶側管② | 点滴 | 2時間 |
| 4) ソルラクト | 1L | 1 袋 | |
| | ▶側管③ | 点滴 | 4時間 |

〈所要時間 ー〉

day5【ケモセーフ使用】

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------|
| 1) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 24時間 前日の主管に続いて |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | ▶側管① | 点滴 | 15 分 主管①と同時に |

〈所要時間 ー〉

day6

| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| 1) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |

〈所要時間 ー〉