

レジメンcode:	C3-03
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	3wCDDP+RT
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(ブリアプラチン)	80~100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
RT		2	Gy	計 70Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- |                    |        |                       |                   |             |
|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1) 硫酸Mg補正液         |        |                       | 1 A               |             |
| 生食                 | 500ml  |                       | 1 袋               |             |
|                    | 主管①    | 点滴                    | 2時間               |             |
| 2) 生食              | 500ml  |                       | 1 袋               |             |
|                    | 主管②    | 点滴                    | 2時間               |             |
| 3) ホスアプレピタント       | 150mg  |                       | 1 V               |             |
| 生食                 | 100ml  |                       | 1 本               |             |
|                    | ▶側管①   | 点滴                    | 30分               | 主管②開始60分後から |
| 4) パロノセトロン         | 0.75mg |                       | 1 V               |             |
| デキサート              | 6.6mg  |                       | 1 V               |             |
| デキサート              | 3.3mg  |                       | 1 A               |             |
| 生食                 | 50ml   |                       | 1 本               |             |
|                    | ▶側管②   | 点滴                    | 15 分              | 側管①に続いて     |
| 5) シスプラチン(ブリアプラチン) |        | 80~100                | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】   |
| 生食                 | 500ml  | 総液量650ml以下になるように生食を調製 |                   |             |
|                    | 主管③    | 点滴                    | 2時間               |             |
| 6) マンニトールS         | 300ml  |                       | 1 袋               |             |
|                    | 主管④    | 点滴                    | 1時間               |             |
| 7) ソルラクト           | 1L     |                       | 1 袋               |             |
|                    | 主管⑤    | 点滴                    | 3時間               |             |
| 8) ラクテック           | 500ml  |                       | 1 袋               |             |
|                    | 主管⑥    | 点滴                    | 90 分              |             |
| 9) ヘパリンNaロック       | 10ml   |                       | 1 筒               |             |

ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

次ページあり

day2

---

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液	20ml		1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
<hr/>			
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉

day3

---

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液	20ml		1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約6時間30分〉