

レジメンcode:	C34-03	備考
適応がん種:	小細胞肺癌	
レジメン名:	CDDP+VP-16	
間隔:	3~4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A	エトポシドの投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド [®])125mg内服
生食	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	2時間	
2) 生食	500ml		1 袋	
	主管②	点滴	2時間	
3) パロノセトロン	0.75mg		1 V	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管③	点滴	15 分	
4) エトポシド			100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml		1 袋	
	主管④	点滴	2時間	
5) ラクテック	500ml		1 袋	
	主管⑤	点滴	90分	
6) シスプラチン(ブリプラチン)			80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	主管⑥	点滴	2時間	
7) マンニトールS	300ml		1 袋	
	主管⑦	点滴	1時間	
8) ソルラクト	1L		1 袋	
	主管⑧	点滴	3時間	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒	

ルートロック

〈所要時間 約14時間30分〉

次ページあり

day2、3

アプレピタント(イマト)		80 mg
	内服	朝食後

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分

2) エトポシド		100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間

3) 硫酸Mg補正液		1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管③	点滴	4時間

4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
--------------	------	-----	--

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉