

| | |
|-----------|---------------------|
| レジメンcode: | C18-03 |
| 適応がん種: | 大腸癌 |
| レジメン名: | FOLFIRI-IF(インフューザー) |
| 間隔: | 2週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|--------|----------------|------|-------------------|------------|-----|
| CPT-11 | イリノテカン(トポテシン) | 150 | mg/m ² | 点滴(2時間) | d1 |
| I-LV | レボホリナート | 200 | mg/m ² | 点滴(2時間)*1] | d1 |
| 5-FU | フルオロウラシル(5-FU) | 400 | mg/m ² | 点滴(全開) | d1 |
| 5-FU | フルオロウラシル(5-FU) | 2400 | mg/m ² | 点滴(46時間) | d1 |

day1【ケモセーフ使用】

| | | | | | |
|-------------------|--------|------------------------|------|-------------|-----------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | | | |
| | | | | ポート確認 | |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | | |
| ブスコパン | 20mg | 1 A | | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 | | |
| 3) イリノテカン(トポテシン) | | 150 mg/m ² | | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | | | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | | |
| 4) レボホリナート | | 200 mg/m ² | | | |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 2時間 | 主管②と同時に[*1] | |
| 5) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 50ml | 1 本 | | | |
| | 主管③ | 点滴 | 全開 | | |
| 6) 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | 主管④ | | | フラッシュ | |
| 7) フルオロウラシル(5-FU) | | 2400 mg/m ² | | | |
| 生食 | 100ml | 総液量140ml になるように調製 | | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 46時間 | | |
| | | | | (インフューザー) | |
| | | | | | 〈所要時間 - 〉 |

day3

| | | | | | |
|--------------|------|-----|--|--------|-----------|
| 1) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | | |
| | | | | ルートロック | |
| | | | | | 〈所要時間 - 〉 |