

レジメンcode:	C18-04
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+FOLFIRI-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ペバシズマブ(アバスタチン)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1	A		
					ポート確認
2) 生食	50ml	1	本		
					ルート確保
3) ペバシズマブ(アバスタチン)			5 mg/kg		
生食	100ml	1	本		
	主管①	点滴		初回90分	
				2回目60分	
				3回目以降30分[*1]	
4) パロノセトロン	0.75mg	1	V		
デキサート	6.6mg	1	V		
デキサート	3.3mg	1	A		
ブスコパン	20mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管②	点滴		15分	
5) イリノテカン(トポテシン)			150 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋		
	主管③	点滴		2時間	
6) レボホリナート			200 mg/m ²		
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋		
	▶側管①	点滴		2時間	主管③と同時に[*2]
7) フルオロウラシル(5-FU)			400 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1	本		
	主管④	点滴		全開	
8) 生食	50ml	1	本		
	主管⑤				フラッシュ
9) フルオロウラシル(5-FU)			2400 mg/m ²		
生食	100ml			総液量140ml になるように調製	
	主管⑥	点滴		46時間	
				(インフューザー)	

〈所要時間 ー〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
					ルートロック

〈所要時間 ー〉