

レジメンcode:	C34-05	備考
適応がん種:	小細胞肺癌	
レジメン名:	CBDCA+VP-16	
間隔:	3~4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド	80~100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1~3
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V	エトポシドの投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド) 125mg内服
デキサート	3.3mg	1.5 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴 15 分	
2) エトポシド		80~100 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴 2時間	
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5 AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴 1時間	
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約4時間〉

day2、3

アプレピタント(イメド)	80 mg
	内服 朝食後

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴 15 分	
2) エトポシド		80~100 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴 2時間	
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約3時間〉