

レジメンcode:	C16-07
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	CDDP+CPT-11
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トホ [®] テシン)	70	mg/m ²	点滴(90分)	d1、15
CDDP	シスプラチン(フリ [®] プラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
ポート確認					
2) 硫酸Mg補正液		1 A			
生食	500ml	1 袋			
	主管①	点滴	2時間		
3) 生食	500ml	1 袋			
	主管②	点滴	2時間		
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	▶側管①	点滴	30分	主管②開始60分後から	
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	▶側管②	点滴	15 分	側管①に続いて	
6) イリノテカン(トホ [®] テシン)		70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	90分		
7) ラクテック	500ml	1 袋			
	主管④	点滴	90 分		
8) シスプラチン(フリ [®] プラチン)		80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製			
	主管⑤	点滴	2時間		
9) マンニトールS	300ml	1 袋			
	主管⑥	点滴	1時間		
10) ソルラクト	1L	1 袋			
	主管⑦	点滴	3時間		
11) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
ルートロック					

〈所要時間 約13時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) 硫酸Mg補正液		1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管②	点滴	4時間
4) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day15【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ブスコパン	20mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) イリノテカン(トホ ^o テシ)		70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	90分
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉