

レジメンcode:	C50-12
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	3wDOC+3wHER
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	60~75	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) ドセタキセル(タキソテル)		60~75 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
4) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg	
		2回目以降	6mg/kg	
注射用水	100ml	1 本		60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本		21mg/mlの溶解液になる。
	主管③	点滴	30 分 (初回 90分)	
5) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約3時間30分〉