

レジメンcode:	C18-06
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+mFOLFOX6
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)[*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			
					ルート確保
3) ベバシズマブ(アバスタ)			5 mg/kg		
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴		初回90分	
				2回目60分	
				3回目以降30分[*1]	
4) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴		15 分	
5) オキサリプラチン(エルプラット)			85 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管③	点滴		2時間	
6) レボホリナート			200 mg/m <sup>2</sup>		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴		2時間	主管③と同時に[*2]
7) フルオロウラシル(5-FU)			400 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1 本			
	主管④	点滴		全開	
8) フルオロウラシル(5-FU)			2400 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管⑤	点滴		46時間	

〈所要時間 ー〉

day3

1) 生食	50ml	1 本			
					フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
					ルートロック

〈所要時間 ー〉