

レジメンcode:	C34-06	備考
適応がん種:	小細胞肺癌	
レジメン名:	CBDCA+CPT-11	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	4~6	AUC	点滴(1時間)	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	50	mg/m ²	点滴(90分)	d1、8、15

day1【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V	イリノテカンの投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イムト [®])125mg内服
デキサート	3.3mg	1.5 A	
ブスコパン	20mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) イリノテカン(トポテシン)		50 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	90分
3) カルボプラチン(パラプラチン)		4~6 AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間
4) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	
		〈所要時間	約3時間30分〉

day2、3

アプレピタント(イムト [®])	80 mg	
	内服	朝食後

day8、15【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ブスコパン	20mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) イリノテカン(トポテシン)		50 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	90分
3) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	
		〈所要時間	約2時間30分〉