

レジメンcode:	C22-07
適応がん種:	肝細胞がん
レジメン名:	肝TACE(エピルビシン)
間隔:	

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
EPI	エピルビシン(ファルモルビシン)	50	mg/body	肝動注	d1

day1

1) 生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴	4時間	(8:00)	
2) ヴィーン3G	500ml		1 瓶		
	主管②	点滴	3時間	(12:00)	
3) ヴィーン3G	500ml		1 瓶		
	主管③	点滴	3時間	(15:00)	
4) ヴィーン3G	500ml		1 瓶		
	主管④	点滴	3時間	(18:00)	
5) ヒシファーゲン配合静注シリンジ	20ml		3 筒		
	▶側管①	静注		検査前	
6) ガスター	20mg		1 A		
生食	20ml		1 A		
	▶側管②	静注		検査前	
7) ホスアプレピタント	150mg		1 V		
生食	100ml		1 本		
	▶側管③	点滴	30分	検査前	
8) セフオン	1g		1 V		
生食(2ポート)	100ml		1 本		
	▶側管④	点滴	30分	検査前	
9) エピルビシン(ファルモルビシン)			50 mg		
		肝動注		血管造影時	
10) リピオドール480			5 ml		
		肝動注		血管造影時	
11) ジェルパート	1mm		1 V		
		肝動注		血管造影時	
12) グラニセトロン	3mg		1 A		
		静注		血管造影時	
13) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	

<所要時間 約13時間>