

レジメンcode:	C18-07	備考
適応がん種:	大腸癌	
レジメン名:	mFOLFOX6-IF(インフューザー)	
間隔:	2週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*1]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管①	点滴	15 分		
3) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m ²		【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管②	点滴	2時間		
4) レボホリナート		200 mg/m ²			
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴	2時間	主管②と同時に[*1]	
5) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m ²		【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	50ml	1 本			
	主管③	点滴	全開		
6) 生食	50ml	1 本			
	主管④			フラッシュ	
7) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²			
生食	100ml	総液量140ml になるように調製			
	主管⑤	点滴	46時間	(インフューザー)	
				〈所要時間	— 〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	
				〈所要時間	— 〉