

レジメンcode:	C16-10
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	XP療法
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CAP	カペシタビン(ゼロダ)	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

[\*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) 硫酸Mg補正液		1 A		
生食	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	2時間	
3) 生食	500ml	1 袋		
	主管②	点滴	2時間	
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	▶側管①	点滴	30分	主管②開始60分後から
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15分	側管①に続いて
6) シスプラチン(フリプラチン)		80 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	500ml			総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管③	点滴	2時間	
7) マンニトールS	300ml	1 袋		
	主管④	点滴	1時間	
8) ソルラクト	1L	1 袋		
	主管⑤	点滴	3時間	
9) ラクテック	500ml	1 袋		
	主管⑥	点滴	90分	
10) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

day2、3

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) 硫酸Mg補正液		1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管②	点滴	4時間
4) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day1夕～15朝

- 1) カペシタビン(セローダ) [\*] mg  
内服 朝夕食後

[\*]

体表面積	投与量
1. 36㎡未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36㎡～1. 66㎡未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66㎡～1. 96㎡未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96㎡以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】