

レジメンcode:	C16-11
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	HER+XP療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CAP	カペシタビン(セローダ)	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕～d15朝
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

[*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 硫酸Mg補正液		1 A			
生食	500ml	1 袋			
	主管①	点滴	2時間		
3) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg		
		2回目以降	6mg/kg		
注射用水	100ml	1 本			60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本			21mg/mlの溶解液になる。
	主管②	点滴	30分(初回 90分)		
4) 生食	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	2時間		
5) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	▶側管①	点滴	30分		主管③開始60分後から
6) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	▶側管②	点滴	15分		側管①に続いて
7) シスプラチン(プリプラチン)		80 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
生食	500ml				総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管④	点滴	2時間		

8) マンニトールS	300ml		1 袋
	主管⑤	点滴	1時間
9) ソルラクト	1L		1 袋
	主管⑥	点滴	3時間
10) ラクテック	500ml		1 袋
	主管⑦	点滴	90 分
11) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉
 〈初回 約13時間30分〉

day2、3

1) 生食	20ml		1 A
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
3) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
4) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
5) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day1夕～15朝

1) カペシタピン(ゼ^ロダ) [*] mg
内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 36㎡未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36㎡～1. 66㎡未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66㎡～1. 96㎡未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96㎡以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】