

レジメンcode:	C25-01
適応がん種:	膵癌 (術前)
レジメン名:	(術前)S-1+GEM (術後)S-1
間隔:	①～②コース(術前) S-1+GEM 3週間 ③～⑥コース(術後) S-1単剤 6週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
S-1	エスワン	[*1]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	[*2]
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8

[*1]: 下表を参考

[*2]: S-1は①～②コース目までは14日間内服7日間休薬、③～⑥コース目は28日間内服14日間休薬

○術前:①～②コース

day1、8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉

[*2]day1夕～15朝(2週間内服、1週間休薬)

1) エスワン	[*1] mg/m ²
	内服 朝夕食後

[*1]

体表面積	投与量(CCr>60 ml/min)	投与量(CCr:50～60 ml/min)
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】	朝40mg/回、夕20mg/回 【60mg/日】
1.25～1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】	40mg/回 【80mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】	50mg/回 【100mg/日】

○術後:③～⑥コース

[*2]day1～28(4週間内服、2週間休薬)

1) エスワン	[*1] mg/m ²
	内服 朝夕食後

[*1]表参照

【文献】

国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(Prep-02/JSAP05試験) JCO,2019,49(2) 190-194 (PMID: 30608598)