

レジメンcode:	C18-10	備考
適応がん種:	大腸癌	
レジメン名:	Bv+sLV5-FU2	
間隔:	2週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ペバシズマブ(アバスタ)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|-------------------|-------|------------------------|---------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | ルート確保 |
| 3) ペバシズマブ(アバスタ) | | 5 mg/kg | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 初回90分
2回目60分
3回目以降30分[*1] |
| 4) グラニセトロン | 3mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 15 分 |
| 5) レボホリナート | | 200 mg/m ² | |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 2時間 |
| 6) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 50ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 全開 |
| 7) フルオロウラシル(5-FU) | | 2400 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 46時間 |

〈所要時間 ー〉

day3

- | | | | |
|--------------|------|-----|--------|
| 1) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 2) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |

〈所要時間 ー〉