

レジメンcode:	C99-16	備考
適応:	①関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 ②全身型若年性特発性関節炎、成人スチル病、キャッスルマン病	
レジメン名:	アクテムラ	
間隔:	[*1]	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
TCZ	アクテムラ	8	mg/kg	点滴(200ml/時)	[*1]

[*1]

1) 生食	50ml	1 本	点滴	ルート確保	
2) アクテムラ		8 mg/kg			
生食	250ml[*2]	1 本			
	主管①	点滴	200ml/時	インラインフィルター必須	
3) 生食	50ml	1 本			
		30分		フラッシュ	

〈所要時間 約2時間〉

[*1]

- ①関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 :4週間
 ②全身型若年性特発性関節炎、成人スチル病、キャッスルマン病 :2週間(症状により1週間まで投与間隔は短縮可能)

[*2]

・体重25kg以下の場合は、50mlの生理食塩液へ加え、希釈する

*本剤投与前に以下の感染症検査が必要

- ・結核 :十分な問診及び胸部レントゲン検査、インターフェロン γ 遊離試験又はツベルクリン反応検査
- ・B型肝炎:HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体

* 生ワクチン接種について

本剤投与中 :接種不可

本剤投与中止後:3~6ヶ月の間隔を空けることが望ましい