

レジメンcode:	C18-12
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Cet+CPT-11
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス(初回)	400	mg/m ²	点滴(2時間)	
	(2回目以降)	250	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(90分)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ブスコパン	20mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) アービタックス	初回	400 mg/m ²		
	2回目以降	250 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	初回2時間	
			2回目以降1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	1時間	経過観察(2回目以降は15分で)
5) イリノテカン(トポテシン)		150 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋		
	主管④	点滴	90分	
6) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約4時間〉

(初回 約5時間30分)

次ページあり

day8

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) アービタックス			250 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	1時間	経過観察(2回目以降は15分で)
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間〉