

レジメンcode:	C16-13
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	HER+FP
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~5

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 硫酸Mg補正液		1 A			
生食	500ml	1 袋			
	主管①	点滴	2時間		
3) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg		
		2回目以降	6mg/kg		
注射用水	100ml	1 本		60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。	
生食	100ml	1 本		21mg/mlの溶解液になる。	
	主管②	点滴	30分	(初回 90分)	
4) 生食	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	2時間		
5) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	▶側管①	点滴	30分	主管③開始60分後から	
6) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	▶側管②	点滴	15分	側管①に続いて	
7) シスプラチン(プリプラチン)		80 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】	
生食	500ml			総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	2時間		
8) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】	
生食	1000ml	1 袋			
	主管⑤	点滴	24時間		

9) マンニトールS	300ml		1 袋	
	▶側管③	点滴	1時間	主管⑤と同時に
10) ソルラクト	1000ml		1 袋	
	▶側管④	点滴	3時間	側管③に続いて

〈所要時間 ー〉

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg		1 V	
生食	50ml		1 本	
	▶側管①	点滴	15 分	
2) 硫酸Mg補正液			1 A	
生食	1000ml		1 袋	
	▶側管②	点滴	4時間	側管①に続いて
3) フルオロウラシル(5-FU)			800 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	1000ml		1 袋	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day4、5【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg		1 V	
生食	50ml		1 本	
	▶側管①	点滴	15 分	
2) フルオロウラシル(5-FU)			800 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	1000ml		1 袋	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day6

1) 生食	50ml		1 本	
				フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒	
				ルートロック

〈所要時間 ー〉