

レジメンcode:	C16-14
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	HER+TS-1+CDDP療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~15朝
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	60	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

[*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml		1 A		
					ポート確認
2) 硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴	2時間		
3) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg		
		2回目以降	6mg/kg		
注射用水	100ml		1 本		60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml		1 本		21mg/mlの溶解液になる。
	主管②	点滴	30 分 (初回 90分)		
4) 生食	500ml		1 袋		
	主管③	点滴	2時間		
5) ホスアプレピタント	150mg		1 V		
生食	100ml		1 本		
	▶側管①	点滴	30分		主管③開始60分後から
6) パロノセトロン	0.75mg		1 V		
デキサート	6.6mg		1 V		
デキサート	3.3mg		1 A		
生食	50ml		1 本		
	▶側管②	点滴	15 分		側管①に続いて
7) シスプラチン(プリプラチン)			60 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml				総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管④	点滴	2時間		

次ページあり

8) マンニトール	300ml		1 V
	主管⑤	点滴	1時間
9) ソルラクト	1L		1 袋
	主管⑥	点滴	3時間
10) ラクテック	500ml		1 袋
	主管⑦	点滴	90 分
11) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

〈初回 約13時間30分〉

day2、3

1) 生食	20ml		1 A
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
3) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
4) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
5) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day1夕～15朝

1) ティーエスワン	[*] mg
	内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 25㎡未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25～1.5㎡未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5㎡以上	60mg/回 【120mg/日】