

レジメンcode:	C16-15
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	CAPOX (XELOX)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	130	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
CAP	カペシタビン(セローダ)	[*]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝

[*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴	30分		
3) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1.5 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	15分		
4) オキサリプラチン(エルプラット)		130 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	2時間		
5) 生食	50ml	1 本			
				フラッシュ	
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	

〈所要時間 約3時間30分〉

day1夕~day15朝

1) カペシタビン(セローダ)	[*] mg/m ²
	内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 36m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36m ² ~1. 66m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66m ² ~1. 96m ² 未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96m ² 以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】