

レジメンcode:	C18-15
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+CAPOX(XELOX)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	7.5	mg/kg	点滴[*1]	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	130	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
CAP	カペシタビン(セローダ)	[*2]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝

[*2]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			
					ルート確保
3) ベバシズマブ(アバスタ)		7.5 mg/kg			
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴		初回90分	
				2回目60分	
				3回目以降30分[*1]	
4) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴		15分	
5) オキサリプラチン(エルプラット)		130 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管③	点滴		2時間	
6) 生食	50ml	1 本			
					フラッシュ
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
					ルートロック

〈所要時間 約3時間30分〉

〈2回目 約4時間00分〉

〈初回 約4時間30分〉

次ページあり

day1夕～day15朝

1) カペシタビン(セロータ)

[*2] mg/m²

内服 朝夕食後

[*2]

体表面積	投与量
1. 36m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36m ² ～1. 66m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66m ² ～1. 96m ² 未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96m ² 以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】