

レジメンcode:	C16-20	備考
適応がん種:	胃癌	
レジメン名:	FP	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~5

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

**day1【ケモセーフ使用】**

1) 生食	20ml	1 A		
ポート確認				
2) 硫酸Mg補正液		1 A		
生食	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	2時間	
3) 生食	500ml	1 袋		
	主管②	点滴	2時間	
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	▶側管①	点滴	30分	主管②開始60分後から
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15分	側管①に続いて
6) シスプラチン(プリプラチン)		80 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>	
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	主管③	点滴	2時間	
7) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>	
生食	1000ml	1 袋		
	主管④	点滴	24時間	
8) マンニトールS	300ml	1 袋		
	▶側管③	点滴	1時間	主管④と同時に
9) ソルラクト	1000ml	1 袋		
	▶側管④	点滴	3時間	側管③に続いて

〈所要時間 -〉

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15 分	
2) 硫酸Mg補正液		1 A		
生食	1000ml	1 袋		
	▶側管②	点滴	4時間	側管①に続いて
3) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋		
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day4、5【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15 分	
2) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 袋		
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day6

1) 生食	50ml	1 本		フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		ルートロック

〈所要時間 ー〉