

レジメンcode:	C18-20
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Pmab+FOLFIRI
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Pmab	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)[*1]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			
					ルート確保
3) ベクティビックス		6 mg/kg			
生食	100ml	全量100mLになるように生食調製 (フィルター必須)			
	主管①	点滴	1時間		
4) 生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	30 分		
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管③	点滴	15 分		
6) イリノテカン(トポテシン)		150 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管④	点滴	2時間		
7) レボホリナート		200 mg/m ²			
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴	2時間	主管④と同時に[*1]	

次ページあり

8) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1 本	
	主管⑤	点滴	全開
9) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管⑥	点滴	46時間

〈所要時間 ー 〉

day3

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 ー 〉