

レジメンcode:	C16-22
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	mFOLFOX6-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与方法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間) [*1]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管①	点滴	15 分		
3) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m <sup>2</sup>			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管②	点滴	2時間		
4) レボホリナート		200 mg/m <sup>2</sup>			
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴	2時間		主管②と同時に[*1]
5) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m <sup>2</sup>			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1 本			
	主管③	点滴	全開		
6) 生食	50ml	1 本			
	主管④				フラッシュ
7) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m <sup>2</sup>			
生食	100ml	総液量140ml になるように調製			
	主管⑤	点滴	46時間		(インフューザー)

〈所要時間 ー〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
					ルートロック

〈所要時間 ー〉