

レジメンcode:	C03-19	備考
適応がん種:	頭頸部癌	
レジメン名:	weeklyCDDP+RT	
間隔:	1週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	40	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
RT		2	Gy	計 66Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴		2時間	
2) 生食	500ml		1 袋		
	主管②	点滴		2時間	
3) ホスアプレピタント	150mg		1 V		
生食	100ml		1 本		
	▶側管①	点滴	30分		主管②開始60分後から
4) パロノセトロン	0.75mg		1 V		
デキサート	6.6mg		1 V		
デキサート	3.3mg		1 A		
生食	50ml		1 本		
	▶側管②	点滴	15分		側管①に続いて
5) シスプラチン(フリプラチン)			40 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml				総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管③	点滴		2時間	
6) マンニトールS	300ml		1 袋		
	主管④	点滴		1時間	
7) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑤	点滴		2時間	
8) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑥	点滴		2時間	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		

ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

次ページあり

day2

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液	20ml		1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

day3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液	20ml		1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約5時間〉

【文献】

JCOG1008試験: J Clin Oncol.2022 Jun 20;40(18):(PMID:35230884)

【適応】

術後補助化学放射線療法