

レジメンcode:	C18-36
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	IRIS
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	125	mg/m ²	点滴(90分)	d1、15
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1~14

day1、15【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) パロノセロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ブスコパン	20mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) イリノテカン(トポテシン)		125 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋		
	主管②	点滴	90分	
4) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック
				〈所要時間 約2時間30分〉

day1~14

1) ティーエスワン	[*] mg
	内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】