

レジメンcode:	C50-34
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	Pertuzumab+3wHER
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	パージェタ(初回)	840	mg/body	点滴(1時間)	
	(2回目以降)	420	mg/body	点滴(30分まで短縮可)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1

day1

- | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | | |
| | | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | | | | ルート確保 |
| 3) パージェタ | | 初回 | 840mg/body | |
| | | 2回目以降 | 420mg/body | |
| 生食 | 250ml | | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 1時間 | 2回目以降は30分まで短縮可能 |
| 4) 生食 | 50ml | | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 (初回 1時間) | 経過観察 |
| 5) トラスツズマブ(ハーセプチン) | | 初回 | 8mg/kg | |
| | | 2回目以降 | 6mg/kg | |
| 注射用水 | 100ml | | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管③ | 点滴 | 30 分 (初回 90分) | |
| 6) 生食 | 50ml | | 1 本 | |
| | | | | フラッシュ |
| 7) ヘパリンNaロック | 10ml | | 1 筒 | |
| | | | | ルートロック |

〈所要時間 約2時間〉

〈初回 約4時間〉

* 術前・術後の薬物療法の場合には、投与期間は12ヶ月間までとする。