

レジメンcode:	C18-21
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Cet+mFOLFOX6
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス(初回)	400	mg/m ²	点滴(2時間)	
	(2回目以降)	250	mg/m ²	点滴(1時間)	d1.8
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)[*1]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) アービタックス	初回	400 mg/m ²	
	2回目以降	250 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	初回2時間 2回目以降1時間
4) 生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	1時間 経過観察 2回目以降は15分で
5) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間

次ページあり

6) レボホリナート		200 mg/m ²		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	▶側管①	点滴	2時間	主管④と同時に[*1]
7) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1 本		
	主管⑤	点滴	全開	
8) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋		
	主管⑥	点滴	46時間	

〈所要時間 ー 〉

day3

1) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 ー 〉

day8

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) アービタックス		250 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	15分	経過観察
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間〉