

レジメンcode:	C56-26
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	weeklyTC
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル	60	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15
CBDCA	カルボプラチン	2	AUC	点滴(1時間)	d1、8、15

*臨床試験では6コース施行

day1、8、15【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1	A		
デキサート	6.6mg	1	V		
デキサート	3.3mg	1	A		
ポララミン	5mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分		
2) パロノセトロン	0.75mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管②	点滴	30分		
3) パクリタキセル		60	mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須	
4) カルボプラチン		2	AUC		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋		
	主管④	点滴	1時間		
5) 生食	50ml	1	本		

フラッシュ

〈所要時間 約3時間〉

【文献】

海外第Ⅲ相試験(MITO-7試験)Lancet Oncol 2014;15:396-405:(PMID:24582486)