

レジメンcode:	C18-27
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	2wCet+FOLFIRI
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*1]	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシ)	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ブスコパン	20mg	1 A	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) アービタックス		500 mg/m <sup>2</sup>	
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	初回2時間
			2回目以降は1時間(600mgを超える場合は90分)*1]
4) 生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	1時間 経過観察
			2回目以降は15分で

次ページあり

5) イリノテカン(トポテシ)		150 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間
6) レボホリナート		200 mg/m <sup>2</sup>	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	▶側管①	点滴	2時間 主管④と同時に[*2]
7) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
ブドウ糖液5%	50ml	1 本	
	主管⑤	点滴	全開
8) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管⑥	点滴	46時間

〈所要時間 ー〉

day3

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 ー〉