

レジメンcode:	C18-28
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	2wCet+mFOLFOX6-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス	500	mg/m ²	点滴[*1]	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|---------------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) アービタックス | | 500 mg/m ² | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 初回2時間 |
| | | | 2回目以降は1時間(600mgを超える場合は90分)*1] |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 経過観察 |
| | | | 2回目以降は15分で |
| 5) オキサリプラチン(エルプラット) | | 85 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 |
| 6) レボホリナート | | 200 mg/m ² | |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | |
| | ▶側管① | 点滴 | 2時間 主管④と同時に[*2] |
| 7) フルオロウラシル(5-FU) | | 400 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 50ml | 1 本 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 全開 |
| 8) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管⑥ | | フラッシュ |
| 9) フルオロウラシル(5-FU) | | 2400 mg/m ² | |
| 生食 | 100ml | 総液量140ml になるように調製 | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 46時間 |
| | | | (インフューザー) |

〈所要時間 ー〉

day3

- | | | | |
|--------------|------|-----|--------|
| 1) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |

〈所要時間 ー〉