

レジメンcode:	C18-29
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	2wCet+FOLFIRI-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス	500	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食		1	A		
				ポート確認	
2) パロノセトロン	0.75mg	1	V		
デキサート	6.6mg	1	V		
デキサート	3.3mg	1	A		
ブスコパン	20mg	1	A		
ポララミン	5mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分		
3) アービタックス		500	mg/m ²		
生食	250ml	1	袋		
	主管②	点滴	初回2時間		
			2回目以降は1時間(600mgを超える場合は90分)*1]		
4) 生食	50ml	1	本		
	主管③	点滴	1時間 経過観察		
			2回目以降は15分で		
5) イリノテカン(トポテシン)		150	mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋		
	主管④	点滴	2時間		
6) レボホリナート		200	mg/m ²		
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋		
	▶側管①	点滴	2時間	主管④と同時に[*2]	

次ページあり

7) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	50ml	1 本	
	主管⑤	点滴	全開
8) 生食	50ml	1 本	
	主管⑥		フラッシュ
9) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²	
生食	100ml	総液量140ml になるように調製	
	主管⑦	点滴	46時間
			(インフューザー)
〈所要時間 ー 〉			

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック
〈所要時間 ー 〉			