

レジメンcode:	C18-33
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+(TS-1 or カペシタビン)
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバズチン)	7.5	mg/kg	点滴[*1]	d1

+

TS-1	ティーエスワン	[*2]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝
------	---------	------	----	----------	----------

or

CAP	カペシタビン(セローダ)	[*3]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝
-----	--------------	------	----	----------	----------

day1

1) 生食	20ml	1 A			ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			ルート確保
3) ベバシズマブ(アバズチン)		7.5 mg/kg			
生食	100ml	1 本			
主管①	点滴	初回90分			
		2回目60分			
		3回目以降30分[*1]			
4) 生食	50ml	1 本			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉

〈2回目 約2時間〉

〈初回 約2時間30分〉

次ページあり

day1夕 ~day15朝

1) ティーエスワン

【\*2】 mg

内服 朝夕食後

【\*2】

体表面積	投与量
1. 25㎡未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5㎡未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5㎡以上	60mg/回 【120mg/日】

or

day1夕 ~day15朝

1) カペシタビン(セローダ<sup>®</sup>)

【\*3】 mg

内服 朝夕食後

【\*3】

体表面積	投与量
1. 36㎡未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36㎡~1. 66㎡未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66㎡~1. 96㎡未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96㎡以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】