

レジメンcode:	C50-33	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	Pertuzumab+HER+Eribulin	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	パージェタ(初回)	840	mg/body	点滴(1時間)	
	(2回目以降)	420	mg/body	点滴(30分まで短縮可)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴(全開)	d1、8

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) 生食	50ml	1 本			
				ルート確保	
3) パージェタ		初回	840mg/body		
		2回目以降	420mg/body		
生食	250ml		1 袋		
	主管①	点滴	1時間	2回目以降は30分まで短縮可能	
4) 生食	50ml		1 本		
	主管②	点滴	30 分	(初回 1時間) 経過観察	
5) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg		
		2回目以降	6mg/kg		
注射用水	100ml		1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。	
生食	100ml		1 本	21mg/mlの溶解液になる。	
	主管③	点滴	30 分	(初回 90分)	
6) デキサート	6.6mg		1 V		
生食	50ml		1 本		
	主管④	点滴	15 分		
7) ハラヴェン			1.4 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	50ml		1 本		
	主管⑤	点滴	全開		
8) 生食	50ml		1 本		
				フラッシュ	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約4時間30分〉

次ページあり

day8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) ハラヴェン		1.4 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	全開
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間〉

- * DLT: 好中球減少症および発熱性好中球減少症。減量を行う際、下記の用量を参考にすること。
- * QT間隔延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前は心電図検査及び電解質検査を行うこと。
- * 5%ブドウ糖希釈不可。生理食塩水を用いて希釈すること。0.01mg/ml未満の濃度に希釈しないこと。
- * 1バイアル(1mg/2ml)中に5%無水エタノールを0.1ml含有。

減量前の投与量 → 減量後の投与量
1.4mg/m ² → 1.1mg/m ²
1.1mg/m ² → 0.7mg/m ²
0.7mg/m ² → 投与中止を考慮